ZERBAXA®
ceftolozano/tazobactam

PARA SUS PACIENTES CON
NBIH/NBAV

COMBÁTALA HOY
ELIJA ZERBAXA



CASO 3.

Patógenos Gram-negativos en la neumonía bacteriana intrahospitalaria



Casi 1 de cada 4 de estos patógenos era resistente a un carbapenémico

P. aeruginosa y las enterobacteriáceas (E. coli y K. pneumoniae) en conjunto son causantes de casi 59% de todas las infecciones intrahospitalarias por bacterias Gram-negativas a nivel mundial

DISEÑO DEL ESTUDIO

En 2002, MSD puso en marcha el Estudio para Vigilar las Tendencias de Resistencia a los Antimicrobianos (SMART), a fin de vigilar la sensibilidad in vitro de los aislamientos clínicos de bacterias Gram-negativas aerobias y anaerobias facultativas, incluidos los de infecciones intraabdominales (IIA), a 17 antibióticos contra enterobacterias y 11 contra Pseudomonas a nivel internacional, lo que permitiría análisis longitudinales para determinar si los patrones de sensibilidad cambiaban con el tiempo. La recolección de aislamientos de infecciones del tracto urinario empezó a fines de 2009. La recolección de aislamientos de infecciones de las vía respiratorias empezó en 2015, y de aislamientos de bacteriemia, en 2018.

Entre las limitaciones de los datos de SMART están la falta de información para distinguir entre bacterias intrahospitalarias y adquiridas en la comunidad y que el número de sitios de investigación para SMART varió cada año.

Antes de prescribir ZERBAXA consulte la información para prescribir completa disponible escaneando el código QR

MSD

D.R © 2020 Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., E.U.A.
Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial o total.
MSD ARGENTINA S.R.L.
Cazadores de Coquimbo 2841/57, Piso 4 (B1605AZE) - Munro - Vicente López - Bs. As.
Tel.: 11-6090-7200 // www.msd.com.ar // recepcion_argentina@merck.com