



POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

El régimen posológico recomendado es ZERBAXA 1,5 gramos (g) (ceftolozano 1g y tazobactam 0,5g) inyectable, administrado cada 8 horas por infusión intravenosa durante 1 hora en pacientes de 18 años o mayores y con función renal normal o deterioro renal leve. La duración del tratamiento debe estar guiada por la gravedad y el sitio de la infección, y por el progreso clínico y bacteriológico del paciente.¹

Dosis de ZERBAXA[®] 1.5 g (1g ceftolozano y 0.5 g tazobactam) por Infección en Pacientes con CrCl Mayor a 50mL/min

Infección	Dosis	Frecuencia	Tiempo de infusión (horas)	Duración del tratamiento
Infecciones intraabdominales complicadas*	1.5g ZERBAXA [®] (1g ceftolozano/0.5g tazobactam)	Cada 8 Horas	1 hora	4–14 días
Infecciones complicadas del tracto urinario, inclusive pielonefritis	1.5g ZERBAXA [®] (1g ceftolozano / 0.5g tazobactam)	Cada 8 Horas	1 hora	7 días

*Utilizado junto con metronidazol 500 mg por vía intravenosa cada 8 horas

Dado que ZERBAXA se elimina principalmente por vía renal, es necesario ajustar la dosis en los pacientes con clearance de creatinina de 50 mL/min o menor, como se muestra abajo.¹

• En los pacientes con función renal cambiante, vigilar la Clearance de creatinina al menos una vez al día y ajustar la dosis de ZERBAXA según corresponda.

Dosis de ZERBAXA en Pacientes con Insuficiencia Renal

CrCl estimada (mL/min) ^a	Esquema de dosis de ZERBAXA recomendado ^b
30 a 50	750mg (500mg y 250mg) intravenoso cada 8 horas
15 a 29	375mg (250mg y 125mg) intravenoso cada 8 horas
Enfermedad Renal en Etapa Terminal (ERET) con Hemodiálisis (HD)	Una dosis de carga única de 750mg (500mg y 250mg) seguida por una dosis de mantenimiento de 150mg (100mg y 50mg) administrada cada 8 horas durante el resto del periodo de tratamiento (en días de hemodiálisis, administrar la dosis lo más pronto posible, después del término de la diálisis)

- Clearance de creatinina estimada según la fórmula de Cockcroft-Gault.
 - Todas las dosis de ZERBAXA se administran durante 1 hora
- CrCl= Clearance de creatinina.

Antes de prescribir ZERBAXA consulte la información para prescribir completa disponible escaneando el código QR

