



DESCUBRA WELIREG[®],
EL INHIBIDOR DE HIF-2 α
AHORA DISPONIBLE
EN ARGENTINA.

Carcinoma de Células Renales (RCC) Avanzado

WELIREG[®] está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con Carcinoma de Células Renales (RCC) Avanzado después de un inhibidor del receptor de muerte programada-1 (PD-1) o del ligando 1 del receptor de muerte programada (PD-L1) y un inhibidor de la tirosina quinasa del receptor del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF-TKI).

Enfermedad de von Hippel-Lindau (VHL)

WELIREG[®] está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con la enfermedad de von Hippel-Lindau (VHL) que necesiten una terapia para el Carcinoma de Células Renales (RCC) asociado a VHL, hemangioblastomas del sistema nervioso central (SNC) o tumores neuroendocrinos pancreáticos (pNET), que no requieran cirugía inmediata.


Feocromocitoma o paraganglioma (PPGL)

WELIREG[®] está indicado para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos de 12 años de edad o más con feocromocitoma o paraganglioma (PPGL) localmente avanzado, irresecable o metastásico.

Referencia: Información para Prescribir de WELIREG[®]

Material destinado exclusivamente a profesionales de la salud.

Consulte de forma ágil y sencilla información
sobre WELIREG® a través de nuestro WhatsApp.



Conecta+



Antes de prescribir WELIREG®, escanee con su celular
el código QR para consultar



Información para Prescribir



Información Seleccionada de seguridad

Material destinado exclusivamente a profesionales de la salud.